

Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES

EDITION
DLP 29 - B - 88036756
BAS-VIVARAIS

(ARBORICULTURE ET
VITICULTURE)

ABONNEMENT ANNUEL : **115 F**
RÉGISSEUR RECETTES D.R.A.F.

55, rue Mazenod - 69426 LYON CÉDEX 03 - ☎ 78.95.48.48

18 Mars 1987

N° de série continue 139

Bulletin n° 5

ARBORICULTEURS, VITICULTEURS, NOTEZ VOS TRAITEMENTS

- P1 : ABRICOTIER : Monilia - prévoyez une protection soignée des fleurs
CERISIER : Chancre Bactérien - traitez vos vergers sensibles ou atteints
Teigne des fleurs - protection au stade B
PECHER : Puceron vert - un stade sensible : les fondatrices
P2 : FRAISIER : Canevas de protection phytosanitaire : sous tunnel plastique
en Bas-Vivarais
Stades phénologiques : stades repères
P3-4 : Fiche illustrée des tavelures du pommier et du poirier

ARBRES FRUITIERS

ABRICOTIER Bientôt le 2ème traitement cuprique (stade D : pétales visibles)

A partir du stade E, la protection sera réalisée en fonction des conditions climatiques avec un fongicide de synthèse.

CERISIER Stade B, proche sur Burlat en région précoce

CHANCRE BACTERIEN - Au stade B, la 1ère intervention cuprique de printemps

Protégez vos vergers sensibles (jeunes, variétés type Napoléon, Van, Reverchon, Hedelphingen, etc...) et ceux ayant montré des symptômes douteux (annulation de bourgeons, de bouquets de mai, chancres à méplat, dessèchement des branches). Réalisez 2 traitements dosés à 250 g de cuivre métal/hl en mouillant bien.

- le 1er traitement au stade B (gonflement du bourgeon)

- le 2e au stade D (séparation des boutons à l'intérieur des bourgeons).

TEIGNE DES FLEURS - Traitez au stade B les vergers habituellement attaqués.

Cette chenille ronge les bourgeons et les fleurs de l'intérieur. L'ovaire est détruit.

Produit : Oléoparathion à 30 g ma/hl (nb spéc). Ne pas généraliser.

PECHER

PUCERON VERT (MYZUS) - Traitez les fondatrices au bon moment

Elles sont sur les boutons floraux (chiffonnes et bouquets de mai).

Seuil d'intervention : 7 % des rameaux habités.

Date : juste avant que les fondatrices ne puissent entrer dans les fleurs :

- vers la fin du stade C pour les variétés à fleurs campanulées (type Dixired),

- jusqu'au début du stade D pour les variétés à fleurs rosacées (type Springcrest).

Produit : lindane à 30 g ma/hl (formulation huileuse ou "col" ou lindane + huile blanche), pyréthrinoïdes de synthèse, également efficaces contre les pucerons noirs (nb spéc).

Remarque : sauf population importante, ce traitement est inutile sur les variétés qu'il faudra protéger contre les thrips (traitement thrips-myzus à la fin de la chute des pétales).

PETITS FRUITS

FRAISIER (P2) : canevas. 1er traitement dès réception si le stade est atteint.

COMMUNIQUE VIVACOOP (P3 et 4)

Dans un prochain Bulletin : le choix de produits pour le pommier.

P272

PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU FRAISIER (sous tunnel plastique en Bas-Vivarais)

Ce programme simplifié ne prend pas en compte tous les cas particuliers susceptibles d'apparaître en cours de saison. Certains pourront nécessiter un diagnostic précis avant toute intervention.


EPOQUE DE TRAITEMENT (stade ci-dessous)	ENNEMIS A COMBATTRE	PRODUITS CONSEILLES Produits Commerciaux en MAJUSCULES(kg/hl)
1 - STADE B-C	Pucerons Maladie des taches pourpres ...	Lindane à la dose du fabricant Manèbe ou Mancozèbe
2 - STADE D-E	Pourriture grise Pucerons Acarieus	Dichlofluanide (EUPARENE 0,250 kg/hl) ou Iprodione (ROVRAL 0,150 kg/hl) ou Vinchlozoline (RONILAN 0,150 kg/hl) ou Procymidone (SUMISCLEX 0,150 kg ou 0,150 l/hl) Aphicides homologués non dangereux pour les abeilles à la dose du fabricant : Phosalone, Pyrimicarbe... Acaricides homologués non dangereux pour les abeilles : Cyhéxatin, Dicofol...
3 - STADE F (pleine floraison) STADE G	Pourriture grise Pourriture grise	Dichlofluanide (EUPARENE 0,125 kg/hl) ou Iprodione (ROVRAL 0,150 kg/hl) ou Vinchlozoline (RONILAN 0,150 kg/hl) Procymidone (SUMISCLEX 0,150 kg ou 0,150 l/hl) Renouvellement si conditions climatiques favorables
4 - STADE H premiers fruits verts	Pourriture grise	Mêmes produits que précédemment

Délai des fongicides avant récolte :

dichlofluanide 7 j. ; iprodione 2 j. ; procymidone 7 j. ; vinchlozoline 3 j.

Les traitements conseillés aux stades D-E, F et H constituent un minimum indispensable.

NE PAS ATTENDRE UN AVIS DE LA STATION POUR ENGAGER CETTE PROTECTION



A repos végétatif
(feuillage peu fourni
quelques feuilles sèches)



B départ en végétation
(apparition des bourgeons
turgescents, feuilles rudimentaires)



C boutons verts
(apparents, bien visibles
parmi les feuilles rudimentaires)



D boutons blancs
(apparents, bien détachés
pétales non dépliés)



E début de floraison
(trois à cinq fleurs ouvertes
par pied)



F pleine floraison
(50 % de fleurs ouvertes)



G fin de floraison
(chute des pétales
et début de nouaison)



H premiers fruits verts
(bien visibles)

G. Felici (Service de la protection des végétaux)